

< CID 2000 >

Dla lepszej higieny wody pitnej

Opis produktu

Specjalnie stworzony w celu zapewnienia lepszej higieny wody pitnej. CID 2000 ma potrójne działanie:

1. mycie systemu pojenia
2. dezynfekcja
3. optymalizacja pH wody pitnej

Właściwości

CID 2000 jest oparty na stabilizowanym nadtlenu wodoru, kwasach organicznych oraz stabilizatorach.

Sposób użycia

1. *Przed zasiedleniami, gruntowne mycie i dezynfekcja systemu pojenia*
 - stężenie 2%
 - czas kontaktu: 4-6 godzin
 - przepłukać obficie czystą wodą
2. *W celu zakwaszenia i sanityzacji wody pitnej:*
 - używać **CID 2000** w stężeniu od 300-400 ml na 1000 L wody pitnej przez 2 do 3 dni w tygodniu co drugi dzień lub przez 3 kolejne dni,

Właściwości fizyko-chemiczne

Postać:	niepianowy, bezbarwny płyn
pH (1%):	3.7
Gęstość (20°C):	1.123 kg/l
Temperatura krzepnięcia:	-30°C

Korozyjność i środki ostrożności

Zaprzestać podawania preparatu 24 godziny przed szczepieniami, Przy stosowaniu **CID 2000** używać pomp teflonowych (jeżeli nie ma, stosować 1% roztwór przed pompą lub skrócić czas kontaktu do 2 godzin)
 Nigdy nie mieszać CID 2000 z innymi środkami (m.in. witaminami, lekami, probiotykami itd.)
 Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki preparatu.

