

VIREX

**PREPARAT DEZYNFEKCYJNY
NA BAZIE NADTLENKU
O SZEROKIM ZAKRESIE
ZASTOSOWANIA**

Kilco^K

SCIENCE IN SOLUTION

ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda
tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl

**BEZPIECZNA
SANITYZACJA WODY
+ SKUTECZNA
ELIMINACJA
GUMBORO**



ZALECANE PREPARATY DEZYNFEKCYJNE KILCO



KILCOX EXTRA
skuteczny w eliminacji
oocyst kokcydów



ECOFOAM PLUS
wytworza długo
utrzymującą się pianę



ACIFOAM
silnie pieniący preparat
kwasowy, eliminuje
bakterie E.coli



VIROSHIELD
idealny do zamgławiania,
eliminuje bakterie
Salmonelli



HPPA
tania i skuteczna
dezynfekcja linii pojenia

POTWIERDZONE DZIAŁANIE ZWALCZAJĄCE

BAKTERIE

Zapalenie pochewki ścięgna

Bacillus

Helicobacter

Streptococcus

Campylobacter

Listeria

Vibrio

Clostridium

Proteus

Enterococcus

Pseudomonas

Dermatophilus

E. coli

Salmonella

Haemophilus

Staphylococcus

WIRUSY

Zakaźna anemia kurcząt

Choroba Auszkiego

Choroba niebieskiego ucha

(syndrom rozrodco-oddechowy)

Choroba GUMBORO

Ptasia grypa

PCV2

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła

(otręt bydła - IBR/IPV)

Syndrom spadku nieśności

Parwowirusowe zapalenie jelit

GRZYBY

Microsporum

Trichophyton

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

K Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5025/12

K Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

K Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

K INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODANO W KARCIE CHARAKTERYSTYKI

INFORMACJE DODATKOWE

K Skutecznie zwalcza najważniejsze czynniki chorobotwórcze wśród wirusów, bakterii i grzybów

K Skuteczny przeciw wirusom Ptasiej Grypy

K Ulega biodegradacji

K Nie wykazuje właściwości żrących w stężeniu roboczym

Kilco^K
SCIENCE IN SOLUTION

Dystrybutor w Polsce: BioPoint, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl, www.kilco.pl

Podmiot odpowiedzialny: KILCO [INTERNATIONAL] LTD. Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire. DG11 2SD Wielka Bryta-

VIREX

**PREPARAT DEZYNFEKCYJNY
NA BAZIE NADTLENKU
O SZEROKIM ZAKRESIE
ZASTOSOWANIA**



INSTRUKCJA STOSOWANIA

OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH

Użyć VIREX w stężeniu min. 1%, rozprzadzić przy użyciu opryskiwacza lub myjki ciśnieniowej albo łancą pianową, w ilości ok. 300ml/m².

DEZYNFEKCJA LINII POJENIA

Użyć VIREX w stężeniu od 0,5% do 1%, w zależności od stopnia zabrudzenia linii. Całkowicie napełnić instalację roztworem. Pozostawić na 3-6h. Następnie przepłukać instalację czystą wodą.

SANITYZACJA WODY

400-500g VIREX rozpuścić w 10l wody i puścić przez dozownik ustawiony na 1%.

OPRYSK W OBECNOŚCI ZWIERZĄT

Dawka 100g VIREX rozpuszczona w 10l wody wystarczy na oprysk obiektu 1000 m². VIREX może być używany z dodatkiem nośnika mgły

DEZYNFEKCJA OBUWIA

Stosować w proporcji 100g VIREX na 10l wody. Mieszać do rozpuszczenia. Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.

